

## A HIDROXIAPATITE NOS REIMPLANTES DENTÁRIOS

Fernando Peres

Todas as técnicas de reimplantes de dentes com apex formado, até agora utilizadas não conseguiram evitar o aparecimento da reabsorção radicular. Esta reabsorção, vertical ou lateral, é sem dúvida, a principal complicação deste tratamento e aparece mais ou menos tardiamente.

Várias são as teorias que tentam explicar este processo, mas sem resultados clínicos aparentes.

O autor, resumidamente, expõe a sua técnica, prevendo-se para no próximo número desta Revista, apresentar a sua casuística e a sua filosofia sobre o assunto.

### FASES DA TÉCNICA

#### FASE I — DO DENTE

- 1 — Limpeza do dente
- 2 — Tratamento endodôntico clássico por via transcoronária
- 3 — Apicectomia de 3 a 4 mm.

- 4 — Fecho apical com ionómero de vidro mais hidroxiapatite
- 5 — Envolvimento de toda a raiz com pó de hidroxiapatite

#### FASE II — DO ALVÉOLO

- 1 — Anestesia
- 2 — Limpeza do alvéolo
- 3 — Verificação da boa adaptação do dente ao alvéolo
- 4 — Plastia alveolar, se necessário
- 5 — Preenchimento de todo o alvéolo com pasta de hidroxiapatite

#### FASE III — DO DENTE MAIS ALVÉOLO

- 1 — Introdução do dente no alvéolo
- 2 — Perfeita adaptação do dente ao alvéolo
- 3 — Fixação durante 3 semanas se possível com brackets e fio metálico
- 4 — Controle da oclusão