

XXXIX Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária (SPEDM) – O Congresso do Centenário Porto, 18 e 19 de outubro de 2019

CASOS CLÍNICOS

#001 Angina De Ludwig: Emergência Estomatológica – Caso Clínico



Pedro Dias Ferraz*, Ivan Cabo, Inês Martins, Olga Vascan, José Paiva Amorim, José Pedro Figueiredo

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Introdução: A Angina de Ludwig é uma forma severa de celulite difusa com início agudo e rápida difusão bilateral, afectando os espaços sub-mandibulares, sub-linguais e sub-mentonianos, que pode culminar numa situação de emergência ameaçadora da vida, pelo que o diagnóstico precoce e o tratamento imediato se consideram essenciais. **Descrição do caso clínico:** É descrito o caso clínico de um doente de 24 anos que deu entrada no Serviço de Urgência, com queixa principal de aumento do volume da região submandibular com evolução de 24 horas. Referiu antecedentes pessoais de asma, sem medicação habitual. Ao exame objetivo, apresentava-se consciente, dispneico (polipneico), com rouquidão progressiva e trismos (com abertura bucal máxima de 3 cm). O pescoço apresentava calor, rubor e edema acentuado. Devido à impossibilidade de realizar o exame intra-oral, requisitou-se TC cervical, a qual revelou coleções abedeadas que condicionam colapso total em alguns níveis da via aérea. Perante o risco de perda de patência da via aérea, foi instituída antibioterapia intravenosa e promoveu-se o encaminhamento imediato do doente para intervenção cirúrgica urgente, pela Cirurgia Maxilo-Facial. Foi realizada drenagem de todas as locas mandibulares com colocação de drenos temporários. O doente ficou internado na Unidade de Cuidados Cirúrgicos Intermédios, sob entubação traqueal. Ao atingir autonomia de manutenção de via aérea, procedeu-se à extração dos dentes 37, 47 e 48. O doente teve alta ao 10.º dia de internamento. **Discussão e conclusões:** A Angina de Ludwig apresenta causa odontogénica em cerca de 70 % dos casos. Outras causas habitualmente incluídas no diag-

nóstico diferencial etiológico são abscessos peri-amigdalinos, lacerações orais ou fraturas mandibulares abertas. O caso apresentado teve etiologia dentária, sendo que o doente recorreu ao SU dois dias depois de ter iniciado tratamento endodôntico de dente 47. A terapêutica antibiótica precoce é essencial para o sucesso do tratamento: os micro-organismos responsáveis são o *S. viridians* e o *S. aureus*. As bactérias anaeróbias estão também muitas vezes envolvidas. O tratamento cirúrgico é necessário no caso de não haver resposta ao tratamento conservador. A obstrução da via aérea constitui a principal causa de morbi-mortalidade, sendo prioritário assegurar a sua patência. Devido à sua rápida progressão e inflamação difusa, a Angina de Ludwig é uma infecção potencialmente fatal, se não diagnosticada precocemente e tratada corretamente.

<http://doi.org/10.24873/j.rpemd.2019.12.465>

#002 Extrações Seriadas – Caso Clínico



Pedro Dias Ferraz, Ana Isabel Teixeira Barbosa*, Jorge Mendes, Américo Ferraz

Clínica Medicina Dentária LA Clinic

Introdução: A extração seriada de dentes tem como finalidade guiar a erupção dos dentes permanentes até alcançar uma oclusão favorável. É aplicada na prática clínica para a correção definitiva de apinhamento primário de etiologia genética. Está indicada em más oclusões de classe I com discrepância dento-maxilar negativa, quando não é indicada a expansão da arcada, ou quando esta é necessária e não é suficiente para atingir a compatibilidade entre o tamanho dentário e a longitude da arcada. **Descrição do caso clínico:** É descrito o caso de uma doente de sete anos de idade, cujo problema principal era a presença de apinhamento severo. Não apresentava antecedentes relevantes ou medicação habitual. Ao exame clínico intra-oral apresentava Classe I de Angle. Quanto aos problemas esqueléticos, apresenta clas-